

LEYENDA




LAVADO DE MANOS

				
Bata polirreforzada	Bata resistente a fluidos	Bata verde tela	Bata verde tejido hada	Delantal plástico


					
Mascarilla FFP2-3	Mascarilla quirúrgica	Mascarilla tela	Gafas universales	Gafas integrales	Pantalla
		Guantes		Guantes limpieza	



FROTIS a paciente sospechoso o confirmado COVID



Ante falta de algún elemento




Tiempo de uso:
✓ FFP2-3: 1 semana
✓ Quirúrgica y tela: 2/día

Limpieza pantalla- Opciones

- ✓ Clinell®
- ✓ Alcohol 70º
- ✓ Lejía (dilución 1/50)



AISLAMIENTO RESPIRATORIO



TRANSPORTE DE MUESTRAS COVID



- ✓ El transporte deberá ser en mano.
- ✓ No usar tubo neumático




En caso de ser necesario transportar en bolsa verde (sin contenedor) llevar siempre en posición vertical

TRASLADO DE PACIENTE COVID




El paciente deberá ir con mascarilla quirúrgica

Ante falta de algún elemento



ÉXITUS - PREPARACIÓN DEL CADÁVER PACIENTE COVID





ÉXITUS - RECOMENDACIONES EN PREPARACIÓN DEL CADÁVER COVID

- *Envolver cadáver en sábana impermeable desechable*
- *Rociar con disolución de agua y lejía (1/10)*
- *Introducir en sudario. Precintar la cremallera con cinta para asegurar la estanqueidad*
- *Rociar con disolución de agua y lejía (1/10)*
- *Colocar sábana/terna limpia bajo el cadáver (para la transferencia a camilla de transporte)*

TRASLADO ÉXITUS







ATENCIÓN CON CONTACTO DIRECTO CON PACIENTE COVID

Atención directa < 15 minutos y < 1m

- ✓ Control Tª y constantes
- ✓ Cambio y control de fluidoterapia y diuresis
- ✓ Toma de muestras a través de catéter
- ✓ Extracción de sangre
- ✓ Recogida/manipulación ropa
- ✓ Retirada contenedores residuos



Ante falta de algún elemento





ATENCIÓN CON CONTACTO DIRECTO CON PACIENTE EN UNIDADES COVID

Atención directa > 15 minutos

Doble + [Gown] + [N95 Mask] + [Face Shield]

- ✓ Aseo y cambio de pañal
- ✓ Maniobras RCP
- ✓ Tareas con fluidos abundantes
- ✓ Preparación cadáver

Si tarea genera aerosol gafa integral



Ante falta de algún elemento

Doble + [Gown] + [Apron] + [Surgical Mask] + [Safety Glasses]

Tiempo de uso (protegida con pantalla):

- ✓ FFP2-3: 1 semana
- ✓ Quirúrgica y tela: 2/día

Limpieza pantalla- Opciones

- ✓ Clinell®
- ✓ Alcohol 70º
- ✓ Lejía (dilución 1/50)



ATENCIÓN CONTACTO DIRECTO CON PACIENTE UNIDADES MIXTAS (COVID Y OTRAS PATOLOGÍAS)

Atención directa > 15 minutos

Doble

- ✓ Aseo y cambio de pañal
- ✓ Maniobras RCP
- ✓ Tareas con fluidos abundantes
- ✓ Preparación cadáver

Si tarea genera aerosol gafa integral →

Ante falta de algún elemento

Doble

Tiempo de uso (protegida con pantalla):


- ✓ FFP2-3: 1 semana
- ✓ Quirúrgica y tela: 2/día

Limpieza pantalla- Opciones

- ✓ Clinell®
- ✓ Alcohol 70º
- ✓ Lejía (dilución 1/50)

→ Uso de bata verde sobre la resistente a líquidos para evitar contaminación cruzada entre pacientes Covid y otras patologías. Cambiar entre paciente Covid y No Covid.

MICROBIOLOGÍA



Laboratorios: Bioquímica, Inmunología, Hematología

Tubo abierto con muestra



+



+



Ante falta de algún elemento



Tiempo de uso (protegida con pantalla):
✓ Quirúrgica y tela: 1/día

Limpieza pantalla- Opciones

- ✓ Clinell®
- ✓ Alcohol 70°
- ✓ Lejía (dilución 1/50)






Rayos portátil y TAC a paciente COVID

Si distancia < 2 m y >15 minutos, contacto directo con el paciente



Ante falta de algún elemento



Si distancia > 2 metros y < 15 minutos



Portátil:
Cubrir con plástico protector
+ desinfección posterior



TAC:
Cubrir mesa y equipos con
plástico protector +
desinfección posterior

Reparación equipos/instalaciones dentro habitación con paciente Covid



Si distancia < 2 metros

Diagram showing required PPE for distance < 2m: gloves, gown, N95 mask, and face shield.

Ante falta de algún elemento

Diagram showing alternative PPE for distance < 2m: gloves, gown, surgical mask, and safety glasses.

Si distancia > 2 metros


Diagram showing required PPE for distance > 2m: gloves, gown, and surgical mask.

- ✓ En caso de uso de nebulizadores, esperar 30 minutos tras su finalización antes de entrar en la habitación
- ✓ Realizar exclusivamente las reparaciones imprescindibles

Manipulación bandejas comida (fuera habitación paciente)



Contención de paciente Covid



Ante falta de algún elemento






Limpieza de habitación CON paciente Covid




Si nebulizador: esperar 30 minutos desde finalización

Limpieza de habitación SIN paciente



Esperar 30 minutos desde la salida del paciente

Endoscopias del tracto respiratorio



Ante falta de algún elemento

Si aerosol: gafa integral



ATENCIÓN PRIMARIA – Centro de Salud



Nivel 0 – Recepción paciente



Si infección respiratoria
mascarilla quirúrgica al paciente




Nivel 1 – Triage / cribado



Paciente con mascarilla quirúrgica

Ante falta de algún elemento



✓ Las mascarillas de tela se lavarán con detergente y se meterán al autoclave, lavado textil (134°C durante 5', adaptar a las características de autoclave disponible).



Residuo: introducir el material utilizado en doble bolsa y retirar como residuo urbano


ATENCIÓN PRIMARIA – Centro de Salud



Nivel 2 – Atención enfermedad respiratoria



Ante falta de algún elemento



Tiempo de uso (protegida con pantalla):

- ✓ FFP2-3: 1 semana
- ✓ Quirúrgica y tela: 2/día

Limpieza pantalla/gafas- Opciones

- ✓ Clinell[®]
- ✓ Alcohol 70º
- ✓ Lejía (dilución 1/50)



- ✓ Las mascarillas FFP2-3 se guardarán en su propia bolsa.
- ✓ Las mascarillas de tela se lavarán con detergente y se meterán al autoclave, lavado textil (134ºC durante 5', adaptar a las características de autoclave disponible).



Residuo: introducir el material utilizado en doble bolsa y retirar como residuo urbano.

ATENCIÓN PRIMARIA – Centro de Salud



Nivel 3 – Sospecha Covid

(si necesaria actuación)



Doble

+



+



+



+



Ante falta de algún elemento



Doble

+



+



+



+



- ✓ Colocar al paciente mascarilla quirúrgica.
- ✓ Aislar al paciente
 - ✓ Si necesita hospitalización, llamar al 061 y solicitar limpieza de la zona
 - ✓ Si no necesita hospitalización, enviar a domicilio y solicitar limpieza de la zona

Resto aspectos: similar Nivel 2

ATENCIÓN PRIMARIA – Domicilio



Uso de bata verde sobre la resistente a líquidos que se retirará en doble bolsa en el mismo domicilio.
Antes de salir se colocarán una segunda bata limpia

Ante falta de algún elemento



- ✓ Las mascarillas FFP2-3 se guardarán en su propia bolsa.
- ✓ Las mascarillas de tela se lavarán con detergente y se meterán al autoclave, lavado textil (134°C durante 5', adaptar a las características de autoclave disponible).

Residuo: introducir el material utilizado en doble bolsa y retirar como residuo urbano

- Tiempo de uso (protegida con pantalla):
- ✓ FFP2-3: 1 semana
 - ✓ Quirúrgica y tela: 2/día
 - ✓ Bata resistente a líquidos: 1 semana (si protegido con bata verde)
 - ✓ Bata de tela: 1 día
- Limpieza pantalla/gafas- Opciones
- ✓ Clinell®
 - ✓ Alcohol 70°
 - ✓ Lejía (dilución 1/50)



ATENCIÓN PRIMARIA – Consultorios



Atención al paciente



Si sospecha de Covid:

- ✓ Colocar al paciente mascarilla quirúrgica.
- ✓ Aislar al paciente
 - ✓ Si necesita hospitalización, llamar al 061 y solicitar limpieza de la zona
 - ✓ Si no necesita hospitalización, enviar a domicilio y solicitar limpieza de la zona

En caso de necesitar más equipos se solicitará al Centro de salud de cabecera

Residuo: introducir el material utilizado en doble bolsa y retirar como residuo urbano